



АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПРИ ХРОНИЧНИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

**доц. д-р Бойко СТАМЕНОВ, д.м.
началник на Втора неврологична клиника
УМБАЛ „Д-р Г. Странски” гр. Плевен**



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !





На 26 години Юрий Гагарин станал най-известният човек в света - Колумб в Космоса, Син на Земята, Гражданин на Вселената.

12 април 1961 година разделя човешката история на две епохи: докосмическа и космическа!





ПАРАДОКС

Голяма част от пациентите постоянно се **оплакват** от алергични проблеми ...

... **страхуват** се до смърт от рак или СПИН ...

... но накрая **умират** от болести на органите на кръвообръщението – основно сърдечносъдови и **МОЗЪЧНОСЪДОВИ.**




Парадоксът на профилактиката

Повечето пациенти не се откриват за първична профилактика:

- Над 50% от инсултните болните имат нормално RR
- Над 50% от инсултните болните са непущачи

Влияние на инсулта върху качеството на живот



1. O'Keefe DP et al. JAMA 1995; 274: 1039-1045
2. Burestrom K et al. Qual Life Res 2001; 10: 621-635



ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРКИНСОНОВАТА БОЛЕСТ

селективни инхибитори на
моноаминооксидазата (МАО)

rasagiline (Azilect)

selegiline (Jumex)



ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРКИНСОНОВАТА БОЛЕСТ

КОМТ инхибитори

Comtan (Entacapone)

Tasmar (Tolcapone)



**ПАЦИЕНТИ
С ЕДИНИЧНО ПЪРВО КЛИНИЧНО СЪБИТИЕ,
СУСПЕКТНО ЗА МС**

**ПАЦИЕНТИ
С ПЪРВО КЛИНИЧНО ПРОЯВЕНО СЪБИТИЕ НА
ДЕМИЕЛИНИЗАЦИЯ И С РИСК ОТ КОНВЕРСИЯ
КЪМ МС**

**ПАЦИЕНТИ
С ВИСОК РИСК ОТ КОНВЕРСИЯ КЪМ МС**



Основната цел

на изпитването е да се проучи ефекта на **Rebif New Formulation 44 µg** (три пъти седмично и един път седмично) върху времето за конверсия към МС по **McDonald** в сравнение с плацебо при пациенти с първо клинично проявено събитие на демиелинизация и с риск от конверсия към МС.



ЛЕЧЕНИЕ НА РАЗСТРОЙСТВОТА НА СЪНЯ

Circadin (Melatonin)

Lundbeg



ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР

AXURA (Memantine) Merz

EBIXA (Memantine) Lundbeg

Терапевтични индикации:

**Умерена до тежка степен
на болест на Алцхаймер**



Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Attention Deficit Disorder (ADD) Дефицит на Вниманието и Хиперактивност

Много е важно да знаете, че хиперактивността е поведенческо разстройство при децата, което следва да бъде диагностицирано от ПСИХИАТЪР. Различни специалисти може да изразят съмнения за хиперактивност, но за наличието на такава може да се говори само и единствено след поставяне на диагноза от психиатър или екип от специалисти, в който задължително присъства психиатър.

Към момента психиатрите се въздържат от медикаментозно лечение на хиперактивността - медикаменти се изписват в наистина тежките и трудно овладяемите случаи.

Приема се, че колкото и да е трудна хиперактивността за детето и по-скоро за родителите му, в много голям процент от случаите, тя се израства с възрастта.

CONCERTA® (Methylphenidate)



Благодаря за вниманието!

АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПРИ ХРОНИЧНИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

доц. д-р Бойко СТАМЕНОВ, д.м.
началник на Втора неврологична клиника
УМБАЛ „Д-р Г. Странски” гр. Плевен